



Calendario de Vacunación Infantil 2026

Un gran paso para su salud, hoy y siempre

Vacunas seguras,
niños más sanos




EDAD	ADMINISTRACIÓN	VACUNA	Nº DOSIS TOTALES	INICIO SÍNTOMAS Y DURACIÓN	SÍNTOMAS MÁS FRECUENTES	MANEJO / TRATAMIENTO
2 meses		- Hexavalente 1ª dosis - Neumococo 15V 1ª dosis - Bexsero 1ª dosis - Rotavirus 1ª dosis (oral)	3 (1ª de 3) 3 (1ª de 3) 3 (1ª de 3) 2 (1ª de 2)	El mismo día a última hora y dura 24-72 h	- Fiebre - Malestar general - Dolor e induración en zona de punción	- Paracetamol - Si reacción local, poner frío
4 meses		- Hexavalente 2ª dosis - Neumococo 15V 2ª dosis - Bexsero 2ª dosis - Meningococo C - Rotavirus 2ª dosis (oral)	3 (2ª de 3) 3 (2ª de 3) 3 (2ª de 3) 1 (única dosis) 2 (2ª de 2)	El mismo día a última hora y dura 24-72 h	- Fiebre - Malestar general - Dolor e induración en zona de punción	- Paracetamol - Si reacción local, poner frío
11 meses		- Hexavalente 3ª dosis - Neumococo 15V 3ª dosis	3 (3ª de 3) 3 (3ª de 3)	El mismo día a última hora y dura 24-48 h	- Fiebre - Malestar general - Dolor e induración en zona de punción	- Paracetamol o ibuprofeno - Si reacción local, poner frío
12 meses		- Triple Virica 1ª dosis - Meningococo ACWY 1ª dosis - Bexsero 3ª dosis	2 (1ª de 2) 2 (1ª de 2) 3 (3ª de 3)	A los 5-7 días El mismo día a última hora y dura 24-72 h	- Fiebre - Malestar general - Dolor e induración en zona de punción	- Paracetamol o ibuprofeno - Si reacción local, poner frío
15 meses		Varicela 1ª dosis	2 (1ª de 2)	A los 5-7 días	- Fiebre - Malestar general - Dolor e induración en zona de punción	- Paracetamol o ibuprofeno - Si reacción local, poner frío
3 años		Tetravirica (Triple Virica + Varicela)	2 (2ª de 2)	A los 5-7 días	- Fiebre - Malestar general - Dolor e induración en zona de punción	- Paracetamol o ibuprofeno - Si reacción local, poner frío
6 años		Difteria / Tétanos / Tosferina (DTPa)	2 (1ª de 2)	El mismo día a última hora y dura 24-48 h	- Fiebre - Malestar general - Dolor e induración en zona de punción	- Paracetamol o ibuprofeno - Si reacción local, poner frío
12 años		- Meningococo ACWY - Virus del Papiloma Humano (VPH)	2 (2ª de 2) 1 (única dosis)	El mismo día a última hora y dura 24-48 h	- Fiebre - Malestar general - Dolor e induración en zona de punción	- Paracetamol o ibuprofeno - Si reacción local, poner frío
14 años		Difteria / Tétanos / Tosferina (DTPa)	2 (2ª de 2)	El mismo día a última hora y dura 24-48 h	- Fiebre - Malestar general - Dolor e induración en zona de punción	- Paracetamol o ibuprofeno - Si reacción local, poner frío

VACUNAS FUERA DE CALENDARIO VACUNAL (RECOMENDABLES)

EDAD	VACUNA	ADMINISTRACIÓN	PAUTA / OBSERVACIONES	SÍNTOMAS MÁS FRECUENTES	MANEJO / TRATAMIENTO
A partir de 2 años	Hepatitis A		2 dosis separadas 6 meses	No da síntomas	Ninguno
Todos los años en mayores de 6 meses	Gripe estacional (vacunación anual)	Desde 6 meses Intramuscular De 2 a 18 años o Intranasal o intramuscular		- Fiebre - Malestar general - Dolor e induración en zona de punción - Congestión nasal leve - Secreción nasal leve	- Paracetamol o ibuprofeno - Frio local - Generalmente no requiere tratamiento

LEYENDA DE ADMINISTRACIÓN



Estas vacunas ayudan a proteger frente a enfermedades graves. Cumplir el calendario es la mejor forma de cuidar su salud.



Si presenta fiebre alta persistente, llanto inconsolable, síntomas que empeoran o cualquier reacción que le preocupe, consulte a su pediatra.

Fuente: Calendario de Vacunación Infantil de la Comunidad de Madrid 2026

Información orientativa. Consulte a su profesional sanitario.

